

Navodilo za uporabo

Timijan Bronchostop pastile

suhi ekstrakt zeli vrtne materine dušice

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila svojega zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Timijan Bronchostop pastile in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Timijan Bronchostop pastile
3. Kako uporabljati zdravilo Timijan Bronchostop pastile
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Timijan Bronchostop pastile
6. Dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Timijan Bronchostop pastile in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Timijan Bronchostop pastile se uporablja za lažje izkašljevanje pri prehladnih obolenjih s kašljem.

Zdravilo Timijan Bronchostop pastile je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Timijan Bronchostop pastile

Ne uporabljajte zdravila Timijan Bronchostop pastile

- če ste alergični na suhi ekstrakt zeli vrtne materine dušice, druge rastline iz družine *Lamiaceae* (ustnatice) ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Če se pojavijo težko dihanje, povišana telesna temperatura ali gnojni izpljunek, takoj poiščite zdravniško pomoč!

Uporaba pri otrocih, mlajših od 6 let

Zaradi pomanjkanja podatkov in nevarnosti, da bi otrok nenamerno pogoltnil celo pastilo, tega zdravila ne dajajte otrokom, mlajšim od 6 let.

Druga zdravila in zdravilo Timijan Bronchostop pastile

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni podatkov o medsebojnem delovanju zdravila Timijan Bronchostop pastile z drugimi zdravili.

Zdravilo Timijan Bronchostop pastile skupaj s hrano in pijačo

Na voljo ni podatkov, ki bi dokazovali, da hrana ali pijača vplivata na delovanje zdravila Timijan Bronchostop pastile.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Zaradi pomanjkanja zadostnih podatkov, se jemanje zdravila Timijan Bronchostop pastile med nosečnostjo in dojenjem ne priporoča.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Študij, ki bi dokazovale vpliv zdravila Timijan Bronchostop pastile na sposobnost upravljanja vozil in strojev, niso izvedli.

Zdravilo Timijan Bronchostop pastile vsebuje fruktozo in sorbitol

Zdravilo Timijan Bronchostop pastile vsebuje fruktozo in sorbitol (E420). Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. Kako uporabljati zdravilo Timijan Bronchostop pastile

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila svojega zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odrasli in mladostniki, starejši od 12 let:

Raztopite 1 do 2 pastili v ustih, redno, vsake 3 do 4 ure (4- do 6-krat na dan).

Otroci, stari od 6 do 12 let:

Treba je raztopiti 1 pastilo v ustih, redno, vsake 3 do 4 ure (4- do 6-krat na dan).

Otroci, mlajši od 6 let:

Zaradi pomanjkanja podatkov in nevarnosti, da bi otrok nenamerno pogoltnil celo pastilo, tega zdravila ne dajajte otrokom, mlajšim od 6 let.

Način uporabe

Pastilo počasi raztopite v ustih. Pastile ne pogoltnite.

Trajanje zdravljenja

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Timijan Bronchostop pastile, kot bi smeli

O primerih prevelikega odmerjanja niso poročali.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Timijan Bronchostop pastile

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pri zdravilih, ki vsebujejo materino dušico so poročali tako o preobčutljivostnih reakcijah kot tudi o želodčnih težavah. Pogostnost pojavljanja ni znana (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika
Center za zastrupitve
Zaloška cesta 2
SI-1000 Ljubljana
Faks: + 386 (0)1 434 76 46
e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Timijan Bronchostop pastile

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti se izteče zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

V imenu zdravila navedena beseda »timijan« se nanaša na vrtno materino dušico (sestavino tega zdravila).

Kaj vsebuje zdravilo Timijan Bronchostop pastile

- 1 pastila vsebuje:
59,5 mg suhega ekstrakta zeli vrtno materine dušice (*Thymus vulgaris* L. in/ali *Thymus zygis* L., *herba*) (7 – 13 : 1). Ekstrakcijsko topilo: voda.
- Pomožne snovi so maltodekstrin, arabski gumi (E414), fruktoza, sorbitol (E420), brezvodna citronska kislina (E330), natrijev saharinat (E954), aroma aronije, aroma gozdnih sadežev, tekoči parafin, beli čebelji vosek (E901) in prečiščena voda.

Izgled zdravila Timijan Bronchostop pastile in vsebina pakiranja

Pastile za lizanje so šestkotne oblike in rjave barve.

Zdravilo je pakirano v škatle z 20 pastilami (2 x 10 pastil v pretisnem omotu).

Način izdaje zdravila Timijan Bronchostop pastile

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec
Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Dunaj
Avstrija

Navodilo je bilo odobreno 25. 10. 2013.